

DLP 19-3-68 762090

PUBLICATION PÉRIODIQUE

**Tel. 88-30-34**

**88-06-15**

**ABONNEMENT ANNUEL****X16XK**

**25 F.**

P. 9

## DELAIS D'EMPLOI DES PESTICIDES AVANT LA RECOLTE DE PRODUITS

## VEGETAUX DESTINES A L'ALIMENTATION

...../.....

Nom commun du Produit	:Délais d'in-: terdiction en: : jours :	Observations
Prothoate.....	15	Non dangereux pour les abeilles
Phenkapton.....	15	
Phosalone.....	15	
Carbophénouthion.....	15	
Naled.....	7	48 heures avant la récolte dans les serres sous forme de fumigation:
Bromophos.....	7	
Dichlorvos.....	5	
Imidithion.....	15	
Fénitrothion.....	15	
Médathion.....	15	
		à suivre

# AVERTISSEMENTS

# ARBRES FRUITIERS

## TAVELURE DU POIRIER

Les premières projections d'ascospores viennent d'être observées dans la Vallée de la Loire. Les premières contaminations peuvent donc avoir lieu lors des prochaines pluies. En conséquence, un premier traitement est à effectuer sur toutes les variétés ayant atteint ou dépassé le stade C3 D (séparation des écailles des bourgeons et apparition du sommet des boutons floraux).

Ce traitement n'est pas à effectuer sur les vergers protégés conformément à la note du 29 février. Attendre que le stade C3 D soit développé pour intervenir sur les variétés à débourrement plus tardif.

Pour les vergers des départements de la Mayenne, de la Sarthe et dans la Gâtine du département des Deux-Sèvres, ne pas tenir compte de cette note, attendre de prochaines informations de la Station.

## VIGNE

## INFORMATIONS

## ACARIOSE, ERINOSE

Des traitements de pré-débourrement peuvent être effectués contre les acariens responsables de ces deux affections. Ce traitement est indispensable dans les vignes atteintes par l'Acariose au cours de l'an passé. On peut utiliser l'une des formules suivantes :

- huile jaune à 2 % ou huiles anthracéniques jaunes (1.350 grs + 300 grs. de matière active par hl.). Les bouillies à base de ces produits ne peuvent s'utiliser que jusqu'au début du gonflement des bourgeons.
- bouillie sulfocalcique à 5 %, soufres micronisés mouillables à 2 %, oléoparathion, oléomalathion, oléodiazinon, aux doses indiquées par les fabricants. Ces produits peuvent s'utiliser plus tardivement.

L'Inspecteur de la Protection des  
Végétaux  
J. DIXMERAS.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements  
Agricoles : R. GEOFFRION - J. BOUCHET.

Tirage du 18 MARS 1968.